

Polo Emato-Oncologia-TMO

Direttore

Dr Carlo Dufour

Telefono

Segreteria: +39 (0)10 56363528

Fax

+39 (0)10 56362714

E-mail

carlodufour@gaslini.org

UOC Ematologia

Direttore Carlo Dufour

UOC Laboratorio Cellule Staminali e Terapie Cellulari

Direttore ff Dr. Marina Podestà

UOC Malattie Infettive

Direttore Dr. Elio Castagnola

UOC Oncologia

Direttore Dr. Alberto Garaventa

UOSD Assistenza Domiciliare

Direttore Dr. Sandro Dallorso

UOSD Emostasi e Trombosi

Direttore Dr. Angelo Claudio Molinari

UOSD Neurooncologia

Direttore Dr. Maria Luisa Garrè

UOSD Trapianto Midollo Osseo

Direttore Dr. Edoardo Lanino



**European
Reference
Network**

for rare or low prevalence
complex diseases



Network
Hematological
Diseases (ERN EuroBloodNet)

Genova, 21 aprile 2020

Oggetto: MALATTIE EMORRAGICHE E COVID_19

Dalla Federazione Mondiale per L'emofilia: **Non è stata riscontrata una maggiore suscettibilità alle infezioni in pazienti immunocompetenti con disturbi emorragici.** SARS-CoV-2 viene trasmesso principalmente attraverso goccioline nell'aria provenienti da persone infette. Queste goccioline entrano nel tratto respiratorio superiore dove stabiliscono un'infezione.

<https://www.wfh.org/en/covid-19-communications#wfh>

**Determina AIFE proroga piani terapeutici:
I piani terapeutici scadenti in marzo ed aprile sono prorogati di 90 gg.
Si raccomanda di contattare il Centro Emofilia in caso di mutate necessità**

In considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti anziani e/o con malattie croniche, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo di piani terapeutici di medicinali soggetti a monitoraggio AIFA web-based o cartaceo, AIFA comunica le seguenti disposizioni transitorie. Tali misure saranno valide per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare si comunica che la validità dei piani terapeutici (PT) web-based o cartacei già sottoscritti dai medici specialisti e che risultano in scadenza nei mesi di marzo e aprile sarà estesa di 90 giorni a partire dal momento della scadenza. Al termine del suddetto periodo di proroga, in

assenza di nuove comunicazioni, il rinnovo dei PT dovrà avvenire secondo le consuete modalità. Nel caso il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza al trattamento, l'estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole Regioni.

URL: <https://www.aifa.gov.it/-/misure-transitorie-relative-alla-proroga-dei-piani-terapeutici-aifa-in-tema-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19>

INFORMAZIONI E CONSIGLI PER GLI AFFETTI DA MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE ED ACQUISITE.

Sul sito della **FEDEMO (Federazione delle Associazioni degli Emofilici Italiane)** sono disponibili già tradotte le raccomandazioni per i pazienti e le famiglie prodotte dalla WFH (Federazione Mondiale dell'Emofilia).

Di seguito si riportano quelle più importanti nel nostro contesto, rimandando al link per la documentazione completa.

Per i pazienti emofilici in trattamento con concentrati ricombinanti a emivita standard o prolungata FVIII o FIX, FVIIa, FEIBA o emicizumab:

- Non esistono motivazioni per modificare il regime di trattamento in uso.
- Attualmente non ci sono motivi per essere preoccupati della mancanza di forniture del trattamento, di problemi di produzione o dell'interruzione dell'approvvigionamento.
- Contattare il Centro Emofilia se le scorte a casa, in ospedale (o nelle sedi di raccolta***) sono limitate o se si hanno difficoltà logistiche all'approvvigionamento..
- Se il trattamento viene effettuato a domicilio, non richiedere più farmaco di quello che effettivamente occorre anche se è consigliabile avere alcune dosi di farmaco extra, in caso di ritardo nella consegna o di interruzione momentanea.

Per i pazienti in trattamento con prodotti plasma-derivati di Fattore VIII/Fattore Von Willebrand/Fattore IX:

- Le procedure di inattivazione ed eliminazione virale utilizzate sono sufficienti per eliminare l'involucro lipidico dei virus come SARS-CoV-2.
- Non sono state rilevate interruzioni nell'approvvigionamento di plasma-derivati. La principale preoccupazione è nella diminuzione della raccolta di plasma per la produzione di plasma-derivati
- Donazioni di plasma e sangue continuano ad essere un processo sicuro

Misure specifiche per ridurre l'esposizione al SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19 in pazienti con emofilia

- Tutte le misure per ridurre l'esposizione alle persone con COVID-19 devono essere promosse proattivamente in tutti i pazienti con comorbidità (malattie cardiovascolari, ipertensione, obesità, diabete, HIV, vecchiaia) o in terapia cortisonica o altri farmaci immunosoppressori
- La non esposizione a tutti i soggetti, compresi gli individui a basso rischio e i bambini, è l'unica precauzione per evitare l'infezione. L'isolamento in un luogo e il distanziamento sociale sono i più importanti strumenti da usare.
- Minimizzare il bisogno di visite a operatori sanitari in ospedale o in ufficio. Le cure non urgenti e gli interventi chirurgici dovrebbero essere rinviati.
- Il paracetamolo (acetaminofene) riduce la febbre senza inibire la risposta infiammatoria necessaria per combattere il coronavirus ed è raccomandato per le persone con disturbi emorragici.
- Il paracetamolo (acetaminofene) non dovrebbe superare i 60mg /kg/giorno o 3g/giorno; se superate queste soglie, il paracetamolo potrebbe infatti causare danni.

- L'ibuprofene e altri farmaci antinfiammatori non steroidei (NSAIDs) solitamente non sono consigliati a pazienti con disturbi emorragici perché possono aumentare il sanguinamento per l'inibizione della funzione piastrinica. In aggiunta, in particolare l'ibuprofene sembra peggiorare la situazione clinica data da COVID-19 e aumentare il rischio di infezione da SARS-CoV-2 a causa dell'iper-regolazione del recettore d'ingresso, l'enzima di conversione dell'angiotensina. Tuttavia, le prove a sostegno di ciò sono limitate.
- Misure igieniche specifiche, come il regolare lavaggio delle mani con il sapone, non toccarsi la faccia, coprire i colpi di tosse e gli starnuti per non farli disperdere nell'aria e mantenere almeno 2 metri di distanza dalle altre persone sono fondamentali per prevenire la trasmissione coronavirus.

URL: <https://fedemo.it/covid-19-raccomandazioni-wfh-per-i-pazienti-con-emofilia/>)